

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS A LOS HÁBITOS DE SALUD BUCAL EN PACIENTES ADULTOS DE UN CENTRO ODONTOLÓGICO PRIVADO Y UN CENTRO ODONTOLÓGICO PÚBLICO-CUSCO, 2023

Autora: Yhelka Vannia Durand
Almanza, 1 Cirujana Dentista,
IPRESS 5ta Brigada de
Montaña, Consulta privada,
Universidad Andina del Cusco,
011200384e@uandina.edu.pe,
<https://orcid.org/0009-0005-7741-3879>

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación de los factores sociodemográficos en los hábitos de salud bucal de los pacientes adultos de un Centro Odontológico Privado y un Centro Odontológico Público-Cusco, 2023, la metodología empleada fue de tipo básico, alcance correlacional, diseño no experimental, enfoque cuantitativo, método hipotético-deductivo, de corte transversal, la población estuvo conformada por 256 pacientes; la técnica aplicada fue la encuesta, y el instrumento un cuestionario.

Resultados, del total de pacientes del Centro Odontológico Público (50.39%), el 25,78% presentaron regulares hábitos de salud bucal y el 23,83% tienen malos hábitos, en cambio el 0,78% tuvieron favorables factores sociodemográficos y regulares hábitos de salud bucal.

Asimismo, del Centro Odontológico Privado (49,61%) tienen desfavorables factores sociodemográficos, donde 27,73% tienen hábitos de salud bucal regulares y 21,88% presentaron malos hábitos. Conclusión, se demostró que existe asociación positiva y significativa entre los factores sociodemográficos y los hábitos de salud bucal de los pacientes adultos de un centro odontológico privado y un centro odontológico público. **Palabras claves:** Factores Sociodemográficos, Hábitos, Salud Bucal. Descriptor usado DeCS, MeSH

ABSTRACT

The general objective of this research was to determine the relationship of sociodemographic factors in the oral health habits of adult patients of a Private Dental Center and a Public Dental Center-Cusco, 2023, the methodology used was basic, correlational scope, nonexperimental design, quantitative approach, hypothetical-deductive method, cross-sectional, the population was made up of 256 patients; The technique applied was the survey, and the instrument was a questionnaire.

Results: Of the total number of patients at the Public Dental Center (50.39%), 25.78% had regular oral health habits and 23.83% had bad habits, while 0.78% had favorable sociodemographic factors and regular habits. of oral health. Likewise, the Private Dental Center (49.61%) have unfavorable sociodemographic factors, where 27.73% have regular oral health habits and 21.88% presented bad habits. Conclusion, it was demonstrated that there is a positive and significant association between sociodemographic factors and oral health habits of adult patients from a private dental center and a public dental center. **Key words:** Sociodemographic Factors, Habits, Oral Health. Used descriptor DeCS, MeSH

INTRODUCCIÓN

Los factores sociodemográficos¹ describen a las personas en términos de género², edad³, lugar de residencia⁴, grado de instrucción⁵, nivel de ingresos⁶, ocupación⁷, o factores similares que ayudan a determinar las principales características de las personas, además, su importancia se centra en el empleo de estudios que consideren características cualitativas. En tanto, los hábitos de salud bucal⁸ dan importancia al estado de salud buco-dental, dentro de los cuales, se tomó en consideración evaluar: visita odontológica⁸ (periodicidad y motivo), cepillado dental⁹ (tipo, tiempo y frecuencia), higiene interdental¹⁰ (insumos y frecuencia de renovación) y hábitos de alimentación¹¹; lo que ayuda a evitar enfermedades bucales que pueden generar daños irreversibles en la salud en general, Es por ello que se realizó la presente investigación que opta por estudiar la asociación que existe entre los factores sociodemográficos y los hábitos de la salud bucal en pacientes adultos,

MATERIALES Y MÉTODOS

Para este estudio de enfoque cuantitativo, alcance correlacional, diseño no experimental de corte transversal se utilizó un muestreo probabilístico simple y estratificado, a la que se le aplicó, por medio de la técnica “encuesta”, un cuestionario (validado por un juicio de expertos antes de su aplicación),

con un Alpha de Cronbach mayor a 0,700 (lo que determinó la confiabilidad del instrumento); que se distribuyó de manera presencial y virtual emitido entre abril y mayo del 2023, la cual constó de seis ítems para la primera variable y de 16 ítems para la segunda variable, estos constan de dos escalas de medición, nominal y ordinal, asimismo el valor final se encuentra distribuido de acuerdo a los indicadores.

RESULTADOS

Tabla nº 1 : Factores sociodemográficos y hábitos de salud bucal de los pacientes de los centros odontológicos

Centro	Factores sociodemográficos				
		Desfavorable	Favorable		
Público		Total			
		Desfavorable	Total		
Privado		Total			
		Total			
Hábitos de salud bucal					
Malo		Regular		Total	
n	%	n	%	n	%
61	23,83%	66	25,78%	127	49,61%
0	0,00%	2	0,78%	2	0,78%
61	23,83%	68	26,56%	129	50,39%
56	21,88%	71	27,73%	127	49,61%
56	21,88%	71	27,73%	127	49,61%
117	45,70%	139	54,30%	256	100%

Fuente Propia

En la tabla 1, se observa que del total de pacientes del Centro Odontológico Público 127 presentaron factores sociodemográficos desfavorables representados por el 49,61%, de los cuales 66 pacientes (25,78%) presentaron regulares hábitos de salud bucal y 61 (23,83%) tienen malos hábitos, en cambio el 0,78% tuvieron favorables factores sociodemográficos y regulares hábitos de salud bucal. Asimismo, de 127 pacientes adultos (49,61%) del Centro Odontológico Privado tienen desfavorables factores sociodemográficos, donde 127 pacientes (27,73%) tienen hábitos de salud bucal regulares y 56 (21,88%) presentaron malos hábitos.

Tabla n° 2 : Variable hábitos de salud bucal

Nivel	Frecuencia
Malo	117
Regular	139
Total	256

Porcentaje	Porcentaje acumulado
45,7	45,7
54,3	100,0
100,0	

Fuente Propia

Respecto a la tabla anterior, el 54,3% de los pacientes tienen regulares hábitos de salud bucal, mientras que el 45,7% tienen malos hábitos, estos datos muestran que la mayoría de los pacientes atendidos en los centros especializados, no siempre practican correctamente el cepillado dental, ni siguen dietas regularmente, y a veces realizan visitas odontológicas.

Tabla n° 3 : Hábitos de salud bucal según el género de los pacientes de los centros odontológicos

Centro	Género
Público	Masculino
	Femenino
	Total
Privado	Masculino
	Femenino
	Total
Total	

Hábitos de salud bucal					
Malo		Regular		Total	
n	%	n	%	n	%
26	10,16%	32	12,50%	58	22,66%
35	13,67%	36	14,06%	71	27,73%
61	23,83%	68	26,56%	129	50,39%
32	12,50%	27	10,55%	59	23,05%
24	9,38%	44	17,19%	68	26,56%
56	21,88%	71	27,73%	127	49,61%
117	45,70%	139	45,70%	256	100%

Fuente Propia

En la tabla 3, se evidencia que del total de pacientes del Centro Odontológico Público, 71 (27,73%) pertenecen al género femenino, donde 36 pacientes tienen hábitos de salud bucal regulares y 35 en un nivel malo, en cambio, 58 pacientes (22,66%) son de género masculino, donde 32 muestran regulares hábitos de salud y 26 malos hábitos, en la misma dirección, de los 127 pacientes adultos que pertenecen al Centro Odontológico Privado, 68 (26,56%) son de género femenino, de los cuales 44 tienen hábitos regulares y 24 malos hábitos, a diferencia de 59 pacientes (23,05%) que son de género masculino, 32 tienen malos hábitos de salud bucal y 27 regulares hábitos.

Tabla n° 4 : Hábitos de salud bucal según la edad de los pacientes de los centros odontológicos

Centro	Edad	Hábitos de salud bucal					
		Malo		Regular		Total	
n	%	n	%	n	%	n	%
Público	18 a 25 años	25	9,77%	5	1,95%	30	11,72%
	26 a 35 años	24	9,38%	16	6,25%	40	15,63%
	36 a 45 años	10	3,91%	15	5,86%	25	9,77%
	46 a 55 años	2	0,78%	32	12,50%	34	13,28%
	Total	61	23,83%	68	26,56%	129	50,39%
Privado	18 a 25 años	22	8,59%	18	7,03%	40	15,63%
	26 a 35 años	13	5,08%	18	7,03%	31	12,11%
	36 a 45 años	10	3,91%	19	7,42%	29	11,33%
	46 a 55 años	11	4,30%	16	6,25%	27	10,55%
	Total	56	21,88%	71	27,73%	127	49,61%
Total		117	45,70%	139	54,30%	256	100%

Fuente Propia

En la tabla 4, se observa que en el Centro Odontológico Público, que de 129 (50.39%) pacientes, 40 tienen entre 36-45 años, de los cuales 24 presentaron malos hábitos de salud bucal 16 regulares hábitos, asimismo de 34 pacientes que tienen entre 46-54 años la mayoría presentaron regulares hábitos de salud bucal, en cambio de 30 pacientes que se encuentran en el rango de edad de 18 a 25 años, 25 presentaron malos hábitos de salud bucal; referente a los pacientes del Centro Odontológico Privado,

de 40 pacientes que tienen entre 18-25 años, 22 mostraron malos hábitos de salud bucal y 18 regulares hábitos, en cambio, en los pacientes que están dentro del rango de edad de 26-35 años 18 presentaron regulares hábitos de salud bucal y 13 malos hábitos, igualmente la mayoría de los pacientes que tienen desde 36 a 55 años tienen regulares hábitos.

Tabla n° 5 : Hábitos de salud bucal según la residencia de los pacientes de los centros odontológicos

Centro	Residencia	Hábitos de salud bucal					
		Malo		Regular		Total	
n	%	n	%	n	%	n	%
Público	Urbano	30	11,72%	60	23,44%	90	35,16%
	Rural	24	9,38%	4	1,56%	28	10,94%
	Urbano marginal	7	2,73%	4	1,56%	11	4,30%
	Total	61	23,83%	68	26,56%	129	50,39%
Privado	Urbano	24	9,38%	67	26,17%	91	35,55%
	Rural	19	7,42%	3	1,17%	22	8,59%
	Urbano marginal	13	5,08%	1	0,39%	14	5,47%
	Total	56	21,88%	71	27,73%	127	49,61%
Total		117	45,70%	139	54,30%	256	100%

Fuente Propia

En la tabla 5, se evidencia que 90 (35,16%) pacientes del Centro Odontológico Público viven en la zona urbana, de los cuales 60 presentaron regulares hábitos de salud bucal y 30 malos hábitos, en cambio, de 28 pacientes de la zona rural, 20 presentaron malos hábitos y cuatro regulares hábitos,

de 11 pacientes de la zona urbano marginal siete presentaron malos hábitos de salud y cuatro regulares hábitos, en la misma dirección, en el Centro Odontológico Privado, de 91 (35,55%) pacientes que residen en la zona urbana 67 presentaron regulares hábitos de salud bucal y 24 malos hábitos, a diferencia de los pacientes que viven en la zona rural y urbano marginal donde la mayoría presentan malos hábitos de salud bucal.

Tabla nº 6 : Hábitos de salud bucal según el grado de instrucción de los centros odontológicos

Centro	Grado de instrucción					
Público	Sin estudios					
	Estudios incompletos					
	Primaria completa					
	Secundaria completa					
	Superior completa					
Total						
Privado	Estudios incompletos					
	Primaria completa					
	Secundaria completa					
	Superior completa					
	Total					
Total						
Hábitos de salud bucal						
Malo		Regular		Total		
n	%	n	%	n	%	
0	0,00%	4	1,56%	4	1,56%	
23	8,98%	0	0,00%	23	8,98%	
12	4,69%	0	0,00%	12	4,69%	
10	3,91%	7	2,73%	17	6,64%	
16	6,25%	57	22,27%	73	28,52%	
61	23,83%	68	26,56%	129	50,39%	
10	3,91%	4	1,56%	14	5,47%	
3	1,17%	0	0,00%	3	1,17%	
15	5,86%	14	5,47%	29	11,33%	
28	10,94%	53	20,70%	81	31,64%	
56	21,88%	71	27,73%	127	49,61%	
117	45,70%	139	54,30%	256	100%	

Fuente Propia

En la tabla 6, se muestra que de 73 pacientes del Centro Odontológico Público que tienen como grado de instrucción superior completa, 57 tienen regulares hábitos de salud bucal y 16 malos hábitos, a diferencia de 45 pacientes que pertenecen a los otros grados de instrucción donde la mayoría presentaron malos hábitos de salud bucal y solo 11 tienen regulares hábitos; y de 81 pacientes del Centro Odontológico Privado que pertenecen al grado superior completo, 53 presentan regulares hábitos y 28 malos hábitos de salud bucal, por el contrario en los demás grados de instrucción, se evidencia que 28 pacientes tienen malos hábitos y 18 regulares hábitos de salud bucal.

Tabla nº 7 : Hábitos de salud bucal según ingresos de los pacientes de los centros odontológicos

Centro	Ingresos					
Público	Bajo					
	Medio					
	Alto					
	Total					
Privado	Bajo					
	Medio					
	Alto					
	Total					
Total						
Hábitos de salud bucal						
Malo		Regular		Total		
n	%	n	%	n	%	
24	9,38%	1	0,39%	25	9,77%	
35	13,67%	40	15,63%	75	29,30%	
2	0,78%	27	10,55%	29	11,33%	
61	23,83%	68	26,56%	129	50,39%	
33	12,89%	13	5,08%	46	17,97%	
19	7,42%	51	19,92%	70	27,34%	
4	1,56%	7	2,73%	11	4,30%	
56	21,88%	71	27,73%	127	49,61%	
117	45,70%	139	54,30%	256	100%	

Fuente Propia

En la tabla 7, se halló que del total de pacientes que pertenecen al Centro Público, 75 presentaron un nivel de ingresos medio, de los cuales 40 presentan regulares hábitos de salud bucal y 35 malos hábitos, asimismo en 29 pacientes que tienen un nivel alto de ingresos, 27 presentaron regulares hábitos, a diferencia de 25 pacientes que tienen bajo nivel de ingresos, de los cuales 24 pacientes tienen malos hábitos de salud bucal; asimismo, los pacientes que son atendidos en el centro odontológico privado, de 70 pacientes que tienen ingresos medios, 51 presentan regulares hábitos de salud bucal y 19 malos hábitos, 46 presentaron bajos ingresos donde 33 tienen malos hábitos y 11 regulares hábitos, por último de 11 pacientes que tienen altos ingresos siete tiene regulares hábitos y cuatro malos hábitos.

Tabla n° 8 Hábitos de salud bucal según la ocupación de los pacientes de los centros odontológicos

Centro	Ocupación	Malo		Regular		Total	
		n	%	n	%	n	%
Público	T. Independiente	15	5,86%	0	0,00%	15	5,86%
	T, dependiente	27	10,55%	47	18,36%	74	28,91%
	No trabaja	19	7,42%	21	8,20%	40	15,63%
	Total	61	23,83%	68	26,56%	129	50,39%
Privado	T, Independiente	24	9,38%	11	4,30%	35	13,67%
	T, dependiente	21	8,20%	45	17,58%	66	25,78%
	No trabaja	11	4,30%	15	5,86%	26	10,16%
	Total	56	21,88%	71	27,73%	127	49,61%
	Total	117	45,70%	139	54,30%	256	100%

Hábitos de salud bucal					
Malo		Regular		Total	
n	%	n	%	n	%
15	5,86%	0	0,00%	15	5,86%
27	10,55%	47	18,36%	74	28,91%
19	7,42%	21	8,20%	40	15,63%
61	23,83%	68	26,56%	129	50,39%
24	9,38%	11	4,30%	35	13,67%
21	8,20%	45	17,58%	66	25,78%
11	4,30%	15	5,86%	26	10,16%
56	21,88%	71	27,73%	127	49,61%
117	45,70%	139	54,30%	256	100%

Fuente Propia

En la tabla 8, se evidencia que 74 pacientes del centro público son trabajadores dependientes, de los cuales 47 tienen regulares hábitos de salud bucal y 27 malos hábitos, mientras que de 40 pacientes que no trabajan, 21 presentan regulares hábitos y 19 malos hábitos, a diferencia de 15 pacientes que son trabajadores independientes que presentan malos hábitos de salud bucal; en la misma dirección se encuentran los pacientes del centro privado, donde 66 pacientes que son trabajadores dependientes 45 presentaron regulares hábitos, de 35 pacientes que tienen trabajo independiente 24 tiene malos hábitos y de 26 pacientes que no trabajan 15 muestran regulares hábitos de salud bucal.

DISCUSIÓN

Se demostró que, entre los factores sociodemográficos y los hábitos de salud bucal si existe una asociación significativa. En el mismo sentido, Aguilar y Leandro 1 , en el año 2021, en su tesis hallaron como resultado que existe una relación positiva entre los factores sociodemográficos y el nivel de conocimiento en salud bucal de la comunidad nativa Shirotiari. Al igual en el estudio de Huayllasco y Vásquez2 , en el año 2021, donde hallaron que el conocimiento sobre salud bucal se relaciona significativa y positivamente con los factores sociodemográficos de los padres de familia de una asociación de viviendas de Jicamarca, Huarochiri, 2021. Caso contrario con el estudio realizado por Ayay y Silva3 , en el año 2022, que determinaron que existe relación baja pero significativa, por ello, el estudio muestra que no existe una relación significativa entre los factores sociodemográficos, los hábitos nutricionales y los factores educativos.

Respecto a la asociación entre el género y los hábitos de salud bucal de los pacientes adultos, se obtuvo que el género de los pacientes se asocia de manera significativa con los hábitos de salud bucal en ambos centros odontológicos. En el mismo sentido, Manzur⁴, en el año 2019, en su investigación, procedió a detallar que el género de los pacientes se relaciona significativamente con las enfermedades bucales en la Ipress I-4 San Juan, Iquitos. A diferencia del estudio de Rosales⁵, en el año 2019, que detalló que el sexo de los pacientes no se relaciona significativamente con la higien de las prótesis dentales en la clínica de la Universidad Central de Ecuador. Respecto a la asociación entre la edad y los hábitos de salud bucal de los pacientes adultos, se precisó que la edad de los pacientes se asocia con los hábitos de salud bucal en los centros odontológicos en la región de Cusco. En la misma dirección, Rosales⁵, en el año 2019 en su estudio, detalla que la edad se relaciona significativamente con la higiene de los pacientes referente a las prótesis dentales en la clínica de Universidad Central de Ecuador. Asimismo, Manzur⁴, en el año 2019 en su tesis, concluyó que el grupo etario se relaciona significativamente con las enfermedades bucales en los pacientes de la Ipress I-4 San Juan, Iquitos. Frente a la asociación entre el grado de instrucción y los hábitos de salud bucal de los pacientes adultos, se muestra una relación positiva entre el grado de instrucción y los hábitos de salud bucal de los pacientes atendidos en los centros odontológicos privado y público. En el mismo sentido, Marquez-Arrico et al. ⁶, en el año 2019, en su investigación,

detalló que existe una asociación fuerte entre el nivel educativo y los hábitos de higiene bucal, en un porcentaje de la población adulta de España. Respecto a la asociación entre el nivel de ingresos y los hábitos de salud bucal de los pacientes adultos, se determinó que existe una relación positiva y significativa entre los ingresos y los hábitos de salud bucal de los pacientes atendidos en los centros odontológicos. En la misma dirección, Saraguro-Ortega et al.⁷, en el año 2019, demostró que existe una relación positiva entre el nivel socioeconómico y cultural con el estado de salud buco-dental en los estudiantes de la carrera de odontología de la Universidad Nacional de Loja. A diferencia de Antonio⁸, en el año 2021, que en su investigación detalla que no existe una asociación significativa entre el nivel socioeconómico-cultural y los hábitos de higiene bucal en las madres del programa vaso de leche Sarita Colonia en Pisco. Referente a la asociación entre la ocupación y los hábitos de salud bucal de los pacientes adultos, se precisó que la ocupación de los pacientes se asocia significativamente con los hábitos de salud bucal en ambos centros odontológicos. En cambio, Nauca⁹, en el año 2021, en su investigación concluyo, que la ocupación de los padres de familia no se relaciona significativamente con sus conocimientos y actitudes sobre la salud oral en el distrito de Uraca en la región de Arequipa 2020. Respecto a la asociación entre el lugar de residencia y los hábitos de salud bucal de los pacientes adultos, se halló que la residencia se relaciona significativamente con los hábitos de salud bucal de los

pacientes que acuden al centro odontológico público y privado. En el mismo sentido, Azañedo et al. 10, en el año 2019, precisó que el área de residencia se asocia significativamente con el uso de servicios odontológicos en los pacientes mayores de 60 años a través de la encuesta poblacional realizada en el Perú.

CONCLUSIONES

1. Respecto al objetivo general, se detalló que, si existe una asociación significativa entre los factores sociodemográficos y los hábitos de salud bucal de los pacientes que son atendidos en los centros odontológicos tanto en el público como en el privado, ya que, cuentan con hábitos de salud entre “malo” y “regular” y en su mayoría tienen factores sociodemográficos desfavorables.
2. Se detalló que el género de los pacientes atendidos en los centros odontológicos se asocia significativamente con los hábitos de salud bucal, debido a que el 54.29% de pacientes son del sexo femenino, el 14.06% se atienden en un centro público y cuentan con regulares hábitos de salud bucal, sin embargo, en el sexo masculino, se observó que, el 12.50% de los pacientes que se atienden en un centro privado, cuentan con malos hábitos de salud bucal.
3. Existe una asociación significativa entre la edad de los pacientes y los hábitos de salud bucal de ambos centros odontológicos, debido a que el rango de edad predominante de pacientes encuestados se encuentra entre 18 a 35 años de edad, de los cuales, el 19.15% de pacientes que se atienden en un centro público tienen malos hábitos de salud bucal y el 14.06% de los que se atienden en un centro privado tienen regulares hábitos de salud bucal.

4. Se demostró que la residencia de los pacientes se relaciona significativamente con sus hábitos de salud bucal, esto se debió a que, el 19.53% de pacientes encuestados, provienen de una zona rural y el 16.8% tienen malos hábitos de salud bucal.

5. Se determinó que existe una asociación significativa entre el grado de instrucción y los hábitos de salud bucal de los pacientes, debido a que el 60.16% de pacientes encuestados tienen un grado de instrucción superior completa y el 42.97% tienen regulares hábitos de salud bucal, independientemente si se atienden en un centro público o privado.

6. Se determinó que existe una asociación significativa entre el nivel de ingreso de los pacientes y sus hábitos de salud bucal, ya que el 56.64% de pacientes cuentan con un nivel de ingresos medio, de los cuales, el 35,55% cuentan con regulares hábitos de salud bucal.

7. Se detalló que la ocupación de los pacientes se asocia significativamente con los hábitos de salud bucal en los centros odontológicos, ya que, el 25.79% no trabajan y el 54.69% son trabajadores dependientes y el 30.47% registraron que tienen malos hábitos de salud bucal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Aguilar Y, Leandro A. Factores sociodemográficos y nivel de conocimiento en salud bucal de la comunidad nativa de Shirotiari - Pichari, Cusco 2021. [Tesis para optar título profesional de Cirujano dentista: Universidad Roosevelt]; 2021.
2. Huayllasco J, Vásquez D. Conocimiento sobre salud bucal y factores sociodemográficos de padres de familia de una asociación de viviendas de Jicamarca, Huarochirí 2021. [Tesis para optar el título profesional de Cirujano dentista: Universidad Roosevelt]; 2021.

3. Ayay I, Silva P. Caries de primera infancia en relación al perfil sociodemográfico, hábitos nutricionales y factores educativos en los niños menores de 6 años que acuden al Centro de Salud Huambocancha Baja - Cajamarca 2022. [Tesis para optar el título profesional de Cirujano Dentista: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelu]; 2022.

4. Manzur M. Prevalencia de enfermedades bucales según edad y género en pacientes del 2010 al 2017 de la Ipress i-4 San Juan, Iquitos – 2018. [Tesis para optar título profesional de Cirujano dentista: Universidad Científica del Perú]; 2019.

5. Rosales E. Influencia del nivel socioeconómico en el mantenimiento, manejo y cuidado de prótesis dentales en pacientes atendidos en la clínica de 8vo y 9no nivel de la Universidad Central del Ecuador periodo 2019 [Internet]. [Tesis de Licenciatura: Universidad Central del Ecuador]; 2019. Available from: https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Influencia+del+nivel+socioeconómico+en+el+mantenimiento%2C+manejo+y+cuidado+de+prótesis+dentales+en+pacientes+atendidos+en+la+clínica+de+8vo+y+9no+nivel+de+la+Universidad+Central+del+Ecuador+periodo+2019

6. Marquez-Arrico, Almerich-Silla, Montiel-Company. Oral health knowledge in relation to educational level in an adult population in Spain. *J Clin Exp Dent*. 2019;0–0.

7. Saraguro-Ortega D, Aguilar-Ochoa D, Riofrio-Herrera J, Valarezo-Bravo T, GrandaLoaiza A. Nivel socioeconómico y cultural de los estudiantes de la carrera de odontología de la Universidad Nacional de Loja y su relación con el estado de salud buco-dental. *Polo del Conoc*. 2019 Feb;

8. Antonio E. Relación entre el nivel socioeconómico-cultural y hábitos de higiene bucal en madres del programa de vaso de leche sarita colonia Pisco Tambo. Ayacucho 2021. [Tesis para optar el título profesional de Cirujano Dentista: Universidad Alas Peruanas]; 2021.

9. Nauca R. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y NIVEL DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE SALUD ORAL INFANTIL EN PADRES O CUIDADORES DE PREESCOLARES DEL DISTRITO DE URACA – CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, AREQUIPA – 2020 [Internet]. [Tesis para optar el título profesional de Cirujana Dentista: Universidad Católica de Santa María]; 2021. Available <https://repositorio.ucsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12920/10960/64.3031.O.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

10. Azañedo D, Vargas-Fernández R, Rojas-Roque C. Factores asociados al uso de servicios de salud oral en adultos mayores peruanos: análisis secundario de encuesta poblacional, 2018. *Rev Peru Med Exp Salud Publica*. 2019 Dec;36(4):553–61.